Høsting

Bjørn Inge Rostad

Norsk Landbruksrådgiving

Vekstsesongen

- Markvandring i åkeren
  - Gå jevnlig igjennom åkrene i løpet av vekstsesongen
    - Ugras- har ugrassprøytingen virket tilfredsstillende?
    - Sykdommer
    - innsektangrep
    - Andre vekstforhold
    - Når er kornet modent?

Kartlegging av ugrassituasjonen

Har kjemisk bekjempelse hatt ønsket effekt?

Prøv å finne årsaken hvis ikke forventet effekt ble oppnådd. Riktig middel, dose, riktig utviklingsstadium, sprøyteforhold?

Har noen ugrasarter klart seg bedre enn andre?

Resistente ugras. Vassarve, linbendel, hønsegras.

Finnes det roser med rotugras?

Tegn inn eller GPS merk forekomster av ugrasroser på kart.

Norsk Landbruksrådgiving

Planlegging av høsting

- Tenk nøye igjennom og planlegg høsterekkefølgen!
  - Logistikk
    - Tørking og levering av kornet
- Hvilke sorter har best værresistens
  - Evne til å bevare avling og kvalitet

Planlegging av høsting

- Prioriter tresking av arter/sorter som er mest sårbare i forhold til ugunstig vær
  - ERTER!!-Høstrug(falltall), vårhvete
- Skill ut arealer med mindre optimale forhold på skiftet, der kornkvaliteten kan være dårligere
  - Vendeteiger-skyggepartier-tørkeskadde områder-legdeflekker
  - Kan være lønnsomt å skille ut disse disse arealene å levere for seg

Planlegging av høsting

- Falltall(stivelsekvalitet)
  - Avgjørende for matkvalitet
  - Høstrug bør høstet til rett tid
    - Falltallet går ned raskt når kornet er modent
  - Vårhvete
  - Unngå å blande inn korn fra legdeområder eller korn som er umodent, grønne korn

Hvetepartiet

95%

Falltall: 250

+

5%

Falltall:

80

Samlet parti Falltall:

212

Norsk Landbruksrådgiving

Mykotoksininnhold

- Skyggearealer, tørkeflekker og legdeflekker
  - Kan gi fare for økt innhold av mykotoksiner og høyt innhold av DON
    - Kan være aktuelt å skille ut disse områdene
  - Vurdere dette opp mot vekstsesongen som har vært
  - Har det vært stor risiko for fusariumangrep?

Etterrenninger

- Etterenninger kan forekomme av:
  - Dårlige buskingsforhold på våren
    - Etterfulgt av bedre forhold senere
    - Kan gi nye sideskudd
      - Betydelig seinere modne enn hovedskuddet
        - » Blir normalt mer angrepet av sykdommer og gir mer småkorn
      - Vurdere tresketidspunkt

Planlegging

- En god plan er viktig!!
  - Utnytte gårdens resurser best mulig
  - Spre risiko
    - Bruk sorter med ulik krav til veksttid
      - Da modnes kornet til ulik tid
      - Bedre mulighet til å ta vare på kvaliteten
      - Reduserte tørkeutgifter
      - Får utnyttet gårdens tørkekapasitet
  - Leietresking
    - Drøft med entreprenør, slik at innhøstingen blir mest mulig rasjonell